

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

при эпилептическом приступе



приступы, сопровождающиеся
генерализованными судорогами

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

при эпилептическом приступе

- Не пытайтесь поместить в рот человеку какой-либо предмет.
- Постарайтесь найти у него медицинское заключение/сведения о заболевании.
- Положите его голову на ровную и мягкую поверхность.
- Засеките время продолжительности приступа.
- Ослабьте галстук или другие предметы одежды, которые могут затруднить дыхание.
- Не пытайтесь его удержать.
- Поверните его на один бок.
- По окончании приступа предложите свою помощь.



Большинство приступов не представляют собой экстренной ситуации. Они длятся всего несколько минут, не причиняют особого вреда пациенту и не требуют обращения в стационар. Однако в определенных случаях следует обратиться за экстренной помощью. Так, например, приступ у тех, кто ранее не страдал эпилепсией, может свидетельствовать о серьезном заболевании.

Другие случаи, при которых следует обратиться за экстренной медицинской помощью - приступ длится более 5 минут

- Отсутствие эпилепсии и эпилептического расстройства в истории болезни.
- Медленное восстановление после приступа, вторичный приступ или затрудненное дыхание после приступа.
- Беременность или наличие других медицинских диагнозов.
- Любые признаки физического повреждения после приступа.